



**Orsak och konsekvenser** vid förvärvad hjärnskada  
(Utvalda delar av den verkliga foldern)

### Vilka behandlingar ges på en intensivvårdsavdelning?

Under tiden på intensivvården kanske ditt barn är medvetslöst. Ibland behövs särskild utrustning som övervakning.

Även följande behandlingar och hjälpmedel kan användas:

**Ventilation:** Om ditt barns andning inte är stabil, är det nödvändigt att med en maskin som hjälper till med andningen.

**Övervakning av trycket i hjärnan:** I den tidiga fasen efter en hjärnskada kan hjärnan bli svullen och trycket kan bli högt.

**Intravenösa vätskor:** En del barn kan inte äta eller dricka som vanligt utan behöver dropp (intravenös matning).

**Nasosond/matsond:** In den tidiga fasen efter en hjärnskada behöver ditt barns mage hållas tom och maten ges via sond.

**Urinkateter:** Inledningsvis kan det behövas en kateter till urinblåsan för att underlätta mätning

### **Vem tar hand om barnet på intensivvårdsavdelningen?**

Det kan vara bra att känna till vem som gör vad så att du vet vem som kan svara på dina frågor. Du har

Intensivvårdsläkaren ansvarar för den dagliga vården under den tid som ditt barn befinner sig på intensi

Neurokirurgen har specialistutbildning för att ta hand om ett flertal olika hjärn- och ryggradsproblem.

Sjuksköterskor kan svara på frågor om ditt barns vård. Den tjänstgörande sjuksköterskan under varje sk

### **Vilka tester kan göras under de tidiga stadierna?**

Datortomografi (DT) är en speciell röntgenundersökning som ger bättre bilder av hjärnan än vanlig röntg

Magnetisk resonanstomografi (MR) är en undersökning av hjärnan som ger bilder av områden som inte

Elektroencefalogram (EEG) visar den elektriska aktiviteten i hjärnan. Små elektroder som fästs på huvu

### Vanligaste orsakerna till förvärvade hjärnskador i Sverige är:

- trafikolyckor - ofta med moped eller cykel
- fall
- idrottsskador
- infektioner
- stroke
- syrebrist -vid tex drunkningstillbud

### Vilka olika typer av förvärvade hjärnskador finns det?

Traumatiskt förvärvade hjärnskador kan delas in i fokala eller diffusa.

- En fokal skada uppstår vanligen efter slag mot huvudet som orsakar skallfraktur. Under frakturen f
- En diffus skada är ofta resultatet av en trafikolycka eller ett fall som har medfört hjärnskakning. De

### Vilka konsekvenser kan hjärnskador få?

Efter en hjärnskada kan det inträffa förändringar som påverkar den fysiska funktionsförmågan, kognition

De kortsiktiga konsekvenserna kan bland annat vara koma (medvetslöshet) eller hjärnskakning (förvirrin

## Orsak och konsekvenser

Senast uppdaterad 2009-08-28 10:06

---

De fysiska problemen kan omfatta svaghet, dålig balans eller koordinationssvårigheter samt utmattnings.

De kognitiva effekterna är ofta nedsatt uppmärksamhet och koncentration, svårigheter att planera och o